

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НОБАЗИТ® ФОРТЕ

**Регистрационный номер:** ЛП-006416  
**Торговое наименование:** НОБАЗИТ® ФОРТЕ  
**Международное непатентованное или группировочное наименование:** энисамия йодид  
**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой

## **Состав**

1 таблетка содержит:  
*действующее вещество:*

N-метил-4-бензилкарбамидопиридиния йодид (Энисамия йодид) – 500,0 мг;

*вспомогательные вещества (ядро):* лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая 101, сахароза (сахар), повидон К-17, коповидон, крахмал, тальк, кальция стеарат.  
*вспомогательные вещества (пленочная оболочка):* Aquarius Prime BAN314047 Yellow: гипромеллоза, титана диоксид, каприл/каприлат (каприловый/каприновый триглицерид), краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный, краситель хинолиновый желтый.

**Описание:** продолговатые двояковыпуклой формы таблетки, покрытые пленочной оболочкой желтого цвета, с риской на одной стороне. На поперечном разрезе: от светло-желтого до желтого или желтого с зеленоватым оттенком цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** противовирусное средство.

**Код АТХ:** J05 AX

## **Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика.** Энисамия йодид – противовирусное средство, производное изоникотиновой кислоты. Эффективно подавляет действие вирусов гриппа и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) за счет непосредственного (ингибирующего) влияния на процесс проникновения вирусов через клеточную мембрану.

Обладает интерферогенными свойствами, способствует повышению концентрации эндогенного интерферона (интерферона альфа и интерферона гамма) в плазме крови в 3-4 раза.

Повышает резистентность организма к вирусным инфекциям.

Снижает острые клинические проявления вирусной интоксикации, способствует сокращению продолжительности заболевания.

**Фармакокинетика.** После перорального приема энисамия йодид быстро попадает в кровь, максимальная концентрация его в крови наблюдается через 2-2,5 часа после употребления. Энисамия йодид и его метаболиты долго циркулируют в кровеносном русле (период полувыведения составляет 13,5-14 часов), метаболизируются в печени и быстро выводятся из тканей (период полувыведения составляет 2-3 часа). Выводится на 90–95 % с мочой в виде метаболитов.

## **Показание к применению**

Лечение гриппа и других ОРВИ, в том числе и в составе комплексной терапии.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы. Детский возраст до 12 лет, беременность, период грудного вскармливания. Наличие аллергических реакций независимо от природы аллергии в анамнезе. Тяжелые органические поражения печени и почек.

## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Противопоказано применение в период беременности и период грудного вскармливания.

## **Способ применения и дозы**

*Лечение начинают при появлении первых признаков заболевания. Если через 3 дня лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.*

Препарат НОБАЗИТ® ФОРТЕ принимают внутрь после еды, не разжевывая.

Взрослым по 500 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки. Максимальная разовая доза – 1 г (2 таблетки), суточная – 2 г (4 таблетки).

Рекомендованный курс лечения от 5 до 7 дней.

Детям с 12 лет по 250 мг (1/2 таблетки) 3 раза в сутки на протяжении 7 дней.

#### **Побочное действие**

*Аллергические реакции:* реакции гиперчувствительности, включая кожные высыпания, крапивницу, ангионевротический отек, зуд.

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* сухость и горький привкус во рту, отек слизистой оболочки полости рта, гиперсаливация, окрашивание языка в желтый цвет, тошнота, рвота, изжога, боль в животе, тяжесть в правом подреберье, диарея, вздутие живота.

*Со стороны дыхательной системы:* одышка, раздражение горла.

*В пострегистрационном периоде в единичных случаях отмечались следующие побочные реакции:* головная боль, головокружение, слабость, колебание артериального давления.

*Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

#### **Передозировка**

При передозировке препарата возможно усиление побочных эффектов, описанных в соответствующем разделе. При их появлении проводят промывание желудка, симптоматическое лечение.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Взаимодействие с другими лекарственными средствами достаточно не изучено.

Препарат НОБАЗИТ® ФОРТЕ усиливает действие антибактериальных и иммуномодулирующих средств. Целесообразным является комбинация данного препарата с аскорбиновой кислотой и другими витаминами. Также препарат НОБАЗИТ® ФОРТЕ можно назначать одновременно с использованием рекомбинантного интерферона.

*Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата НОБАЗИТ® ФОРТЕ проконсультируйтесь с врачом.*

#### **Особые указания**

Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с заболеваниями щитовидной же-

лезы, особенно при гипертиреозе.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Прием энисамия йодида не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

#### **Форма выпуска**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 10 или 20 таблеток в банку из полиэтилена низкого давления.

По 1, 2, 3, 4 или 5 контурных ячейковых упаковок или 1 банку с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

#### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка или банка в пачке).

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии потребителей**

ОАО «Авексима»

125284, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1.

Тел.: +7 (495) 258-45-28.

#### **Производитель:**

ОАО «Ирбитский химфармзавод»

623856, Россия, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова 172.

Адрес производителя:

Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Карла Маркса.124-а.

или

ООО «Авексима Сибирь»

652473, Россия, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, д. 7.